


# 不活化ポリオワクチンを受けている方へ

## ～追加接種（4回目）はお済みですか？～

平成24年9月から、ポリオの予防接種に使用するワクチンが、生ワクチンから不活化ワクチンに変更になっています。この変更により、接種間隔や接種回数が変わりました。

不活化ワクチンは初回接種だけでは長期間、免疫を保つことができず、追加接種を受けることで効果がさらに上がり、免疫が長い期間続きます。

追加接種にあたる4回目の接種は、3回目接種から1年～1年6か月後に受けることになっています。一度母子健康手帳でお確かめください。



## <不活化ポリオワクチン導入後の接種方法>

対象年齢	平成24年7月生まれ以前の子 【1期】生後3か月～7歳6か月に至るまで	
接種回数	1期初回…20日～56日の間隔で3回接種する。	
	1期追加…1期初回(3回)終了後、1年～1年6か月の間に1回接種する。	
生ワクチンと不活化ワクチンの関係	①生ワクチンを2回受けている子	ポリオ予防接種完了
	②生ワクチンを1回と不活化ワクチンを2回受けている子	3回目接種から1年～1年6か月後に1期追加を1回接種する。
	③不活化ワクチンを3回受けている子	
	④生ワクチンを1回と不活化ワクチンを1回受けている子	1期初回を1回接種する。 1年～1年6か月後に1期追加を1回接種する。
	⑤不活化ワクチンを2回受けている子	
	⑥生ワクチンを1回受けている子	1期初回を20日～56日の間隔で2回接種する。 1年～1年6か月後に1期追加を1回接種する。
	⑦不活化ワクチンを1回受けている子	
	⑧全く受けていない子	1期初回を20日～56日の間隔で3回接種する。 1年～1年6か月後に1期追加を1回接種する。
接種場所	市内の協力医療機関で実施します。 希望する医療機関にあらかじめ予約をしてお出かけください。医師の診察後、接種をします。	
持ち物	母子健康手帳、予防接種予診票 *1期3回目と1期追加(4回目)の予診票は、協力医療機関に準備してあります。	

※なお、四種混合ワクチン（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）で接種を受けている子は、ポリオも含まれていますので、四種混合ワクチンの追加接種を受けるようにしましょう。