

子どもの定期予防接種

- <接種方法>** 市内の協力医療機関(7ページ参照)で実施します。希望する医療機関にあらかじめ予約をしてお出かけください。医師の診察後、接種をします。
- <持ち物>** 母子健康手帳、予診票・実施確認証(お持ちでない方は、保健センターへお尋ねください。)
※平成20年11月以前生まれの子(ただし、7歳6か月までの子)
 ・予診票・実施確認証は、予防接種手帳にあります。
 ・麻しん・風しん混合(MR2期)、二種混合(DT)の予診票・実施確認証はご自宅へ送付します。
※平成20年12月～平成26年3月生まれの子
 ・予診票・実施確認証は、ご自宅へ送付します。
※平成26年4月以降生まれの子
 ・予診票は、出生届出時にお渡しします。

【下表の見方】
 ・至るまで…誕生日の前日まで
 ・未済…誕生日の前々日まで

小児用肺炎球菌

対象者：生後2か月～5歳に至るまで *接種開始時期により接種回数等が異なります。
 1期初回…27日以上の間隔で3回接種する。1歳の誕生日前日までに終了。
 1期追加…1期初回(3回)終了後、60日以上の間隔をあけて、生後12か月以降(標準的には生後15か月まで)に1回接種する。

ヒブ (インフルエンザ菌b型)

対象者：生後2か月～5歳に至るまで *接種開始時期により接種回数等が異なります。
 1期初回…27日(医師が必要と認めた場合20日)～56日(3週間～8週間)の間隔で3回接種する。
 1期追加…1期初回(3回)終了後、7か月～13か月の間に1回接種する。

BCG

対象者：生後3か月～1歳に至るまで
 標準的には、生後5か月～8か月までに1回接種する。



四種混合(DPT+IPV) ・ジフテリア・百日せき ・破傷風・ポリオ

対象者：生後3か月～7歳6か月に至るまで(平成24年8月以降生まれの子)
 1期初回…20日～56日(3週間～8週間)の間隔で3回接種する。
 1期追加…1期初回(3回)終了後、1年～1年6か月の間に1回接種する。

三種混合(DPT) ・ジフテリア・百日せき ・破傷風

対象者：生後3か月～7歳6か月に至るまで(平成24年7月以前生まれの子)
 1期初回…20日～56日(3週間～8週間)の間隔で3回接種する。
 1期追加…1期初回(3回)終了後、1年～1年6か月の間に1回接種する。

二種混合(DT) ジフテリア・破傷風

対象者：小学校6年生(平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれの子)
 ※やむを得ない事情で小学校6年生で接種できなかったお子さんは、13歳未満まで接種可能です。
 1回接種する。 *予診票・実施確認証は、平成26年4月中旬にご自宅へ送付します。

不活化ポリオ

対象者：生後3か月～7歳6か月に至るまで
 (①平成24年7月以前生まれの子
 ②四種混合対象の子で三種混合と不活化ポリオで開始した子)
 1期初回…20日～56日(3週間～8週間)の間隔で3回接種する。
 1期追加…1期初回(3回)終了後、1年～1年6か月の間に1回接種する。

※平成24年9月から、ポリオの予防接種に使用するワクチンが生ワクチンから不活化ワクチンに変更になっています。

生ワクチンと不活化ワクチンの関係	①生ワクチンを2回受けている子	ポリオ予防接種完了
	②生ワクチンを1回と不活化ワクチンを2回受けている子	3回目接種から1年～1年6か月後に1期追加を1回接種する。
	③不活化ワクチンを3回受けている子	1期追加を1回接種する。
	④生ワクチンを1回と不活化ワクチンを1回受けている子	1期初回を1回接種する。
	⑤不活化ワクチンを2回受けている子	1年～1年6か月後に1期追加を1回接種する。
	⑥生ワクチンを1回受けている子	1期初回を20日～56日の間隔で2回接種する。
	⑦不活化ワクチンを1回受けている子	1年～1年6か月後に1期追加を1回接種する。
	⑧全く受けていない子	1期初回を20日～56日の間隔で3回接種する。 1年～1年6か月後に1期追加を1回接種する。

※1期初回3回目、1期追加(4回目)の予診票と実施確認証は、協力医療機関に準備してあります。

麻しん・風しん
混合(MR)
麻しん(単抗原)
風しん(単抗原)

対象者：【1期】 満1歳～2歳に至るまで
【2期】 保育園・幼稚園等の年長児
(平成20年4月2日～平成21年4月1日生まれの子)

1期・2期…各1回接種する。
※2期の予診票・実施確認証は、平成26年4月中旬にご自宅へ送付します。
※麻しん・風しんのどちらか一方に罹患した場合は、罹患していない単抗原ワクチンの接種も可能です。詳しくは保健センターへお尋ねください。

日本脳炎

対象者：【1期】 満3歳～7歳6か月に至るまで
【2期】 満9歳～13歳未満

1期初回…6日～28日(1週間～4週間)の間隔で2回接種する。
1期追加…1期初回(2回)終了後、おおむね1年後に1回接種する。
※平成20年12月生まれの子から、予診票・実施確認証は3歳児健康診査通知に同封しています。
2期…標準的には、小学校4年生で1回接種する。

日本脳炎特例措置

※7歳6か月を超えた方(上限は平成7年4月2日以降生まれ)で1期・2期の未接種分を公費で接種することができます。
(平成19年4月2日以降生まれの方には適用しません。)
※特例の予診票・実施確認証は、協力医療機関に準備してあります。

子宮頸がん


対象者：小学校6年生～高校1年生に相当する女子
(平成10年4月2日～平成15年4月1日生まれの子)

3回接種する。
※ワクチンは2種類あり、接種間隔が異なりますので、3回とも同じ種類のワクチンで接種を受ける必要があります。

子宮頸がん予防接種に関する積極的な勧奨の差し控え

子宮頸がん予防接種後に、慢性の痛みを伴う事例や関節痛が現れる事例などの報告があることから、厚生労働省は、平成25年6月14日、「積極的な勧奨を差し控える」との決定をしました。今後接種を希望される方は、接種することで得られるメリットとリスクを十分に理解したうえで、接種を受けてください。

ワクチン相互の間隔



予防接種の注意事項

- 「予防接種と子どもの健康」という冊子などで、受けようとする予防接種の内容をよく読み、十分にご理解していただいたうえで、接種にお出かけください。また、予防接種の接種間隔にご注意ください。
- 予防接種を受けることができない子は、下記のとおりです。
 - 明らかに発熱している子。(医療機関で測定した体温が37.5℃以上の場合です。)
 - 麻しん(はしか)の治ゆから4週間程度経過していない子。
 - 風しん、おたふくかぜ、みずぼうそうなどの治ゆから2～4週間程度経過していない子。
 - 手足口病、突発性発疹、りんご病などの治ゆから1～2週間程度経過していない子。
 - その他、医師が不適当な状態と判断した子。
- 医師からもらった薬を服用している子は、主治医に予防接種を受けてもよいか必ず確認し、接種医に伝えてください。

お知らせ！

国は、現在任意接種となっている水痘の予防接種について、平成26年度中に定期接種化するよう取り組んでいます。詳細が分かり次第、お知らせします。